

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE \_\_\_\_\_

**FICHE CONSEIL N° 3.04**

**Rubrique :** Les pathologies bucco-dentaires et leurs soins

*Le traitement des abcès par antibiotique doit toujours être suivi du traitement de la dent ou de la gencive*

## Les abcès

**On distingue généralement les abcès d'origine dentaire liés à une infection de la dent et les abcès parodontaux liés à une infection de la gencive.**

### Les abcès d'origine dentaire

Ce sont des abcès qui se produisent au bout de la racine d'une dent nécrosée, c'est-à-dire dont le nerf est mort. Cette nécrose peut être due à une grosse carie ou à un traumatisme (choc sur une dent).

Les abcès dentaires peuvent également être dus à une fêlure et, dans ce cas, le nerf de la dent peut être vivant. En général, la dent est sensible à la pression. On observe parfois un gonflement au niveau de la gencive et un écoulement de pus à cet endroit.

Le traitement d'urgence consiste souvent à prescrire des antibiotiques. La dent devra ensuite être dévitalisée pour éviter la récurrence. Dans le cas d'une dent fracturée, la dent sera quasi systématiquement extraite.

### Les abcès parodontaux

Ces sont des infections aiguës de la gencive qui se manifestent par un gonflement avec élimination de pus à la pression. La dent peut être mobile et parfois même se déplacer légèrement.

Le traitement d'urgence consiste à prescrire des antibiotiques. L'abcès peut également être percé pour faire sortir tout le pus. Une fois l'abcès disparu, un traitement parodontal devra être entrepris afin d'éviter une récurrence.



### Nos Conseils

- Les antibiotiques qui vous sont prescrits en cas d'abcès font disparaître tous les symptômes en quelques jours.
- Cela ne veut pas dire que la dent est soignée. Dans tous les cas, il faut impérativement compléter la prise d'antibiotiques par un traitement définitif (extraction, dévitalisation ou traitement parodontal).